Prüfplan

((Code: 05.02.06.02, Version: 04.00)

Anschrift der Trichinenuntersuchungsstelle: Tierarztpraxis Gerald Lippold
Haselbacher Str. 3
07580 Rückersdorf

Angewendete Methode:
(Bitte ankreuzen!):

☒ Magnetrührverfahren ☐ Automatisches Verdauungsverfahren („Trichomatic 35“) (1)

Pepsin: Hersteller und Charge:
OPOPHARMA / Ch.: 751 A 1023

Untersuchungsdatum	Beginn und Ende der Untersuchung (3)	Anzahl der Proben	Probenidentifikation: (2) a) WUS Nr.: b) Trichinenprobenbegleitschein-Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere Tierart	Einwaage Probenmaterial Tierart in g	Einwaage Füllmaterial Tierart in g	Ansatz (100 g) (HS bis 115 g) 2 l Wasser, 16 ml HCl, 10 g Pepsin	Ansatz (50 g) (HS u. WS) 1 l Wasser, 8 ml HCl, 5 g Pepsin	Untersuchungsergebnis negativ	Untersuchungsergebnis positiv	autom. Freigabe	Anmerkungen/ Gewebe-rückstand auf dem Sieb in g (3)	Gewebe-rückstand < 5% (4)	Untersucher
14.10.2026	7.00 / 9.00	1	217581	5 ☐	15,00	x		☒	☐	X	9,8 / !! Pepsin ?	☐	GL
		1	217582	5 ☐				☒	☐	X			
		1	280797	5 ☐				☒	☐	X			
		1	283639	5 ☐				☒	☐	X			
		1	691532	5 ☐				☒	☐	X			
		1	280840	5 ☐				☒	☐	X			

		1	280895	5					☒	☐	X		
		1	280613	5					☒	☐	X		
		1	286682	5					☒	☐	X		
		1	269330	5					☒	☐	X		
		1	691290	5					☒	☐	X		
		1	282197	5					☒	☐	X		
		1	282197	5					☒	☐	X		
		1	283904	5					☒	☐	X		
		1	283958	5					☒	☐	X		
		1	214960	5					☒	☐	X		
		1	263672	5					☒	☐	X		
		1		5					☐	☐	X		
		1		5					☐	☐	X		
		1		5					☐	☐	X		

HS...Hausschwein ***WS...Wildschwein*** ***HCl...Salzsäure (25%ig)***

(1) Austausch des Karbonfilters (Polycarbonat-Membranfilter) in Anmerkungen dokumentieren (s. Nr. 4.3 der VA „Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen“ (Code: 05.02.03))

(2) eindeutiger Rückschluss auf Einzelproben muss möglich sein (ggf. durch Zuordnung von WUS-Nrn., Trichinenprobenbegleitschein-Nrn. o. Ä. zum Ansatz in separater Dokumentation)

(3) inkl. Einwaage, Aufschluss, Auswaage und mind. 5 min je mikroskopische Untersuchung

(4) bei jeder Untersuchung, neuer Pepsincharge und Laborvergleichsuntersuchung (LVU) ist eine Verifizierung durchzuführen (Geweberückstand ≤5% der Einwaage) und zu dokumentiert